

⚠ 安全・安心のために

メニコンお客様センターのご案内

取扱方法や製品に関するお問い合わせは、
メニコンお客様センターまでご連絡ください。
レンズの装用上で異常や違和感を感じた場合は、
眼科医にご相談ください。

✉ メールでのお問い合わせ

メニコン お問い合わせ 検索
www.menicon.co.jp/ask/



※機種によって利用できない場合があります。
※傷、汚れ、破損、光の反射などによっては読み取れない場合があります。

☎ 電話でのお問い合わせ

0120-103109

受付時間/9:00~18:00 ※日・祝日を除きます。

💻 メニコンのホームページ

メニコン 検索
www.menicon.co.jp



※機種によって利用できない場合があります。
※傷、汚れ、破損、光の反射などによっては読み取れない場合があります。

販売名:メニコンZ 承認番号:20700BZZ00739000
販売名:メニコンEX 承認番号:15900BZZ00187000
販売名:メニコンティニュー 承認番号:21800BZZ10125000
販売名:メニコンアイスト 承認番号:20700BZZ00739A01
販売名:メニフォーカルZ 承認番号:21100BZZ00774000

監修:医師 金子京華
制作:株式会社メニコン/名古屋市中区葵三丁目21番19号
RDRGP16005-20230710IQ
2023071030

レンズ購入先

●本レンズは眠る前には必ずはずしてください。




●装用時間を正しく守ってください。



●取扱方法を守り正しくご使用ください。



●定期検査を必ず受けてください。



●異常を感じたら、直ちに眼科医の診察を受けてください。



●破損などの不具合があるレンズは、絶対に使用しないでください。

レンズをつける前に、レンズに破損などの不具合がないかを必ず確認し、不具合が認められたレンズは絶対に使用しないでください。装用中にレンズの破損などによる自覚症状が発生し、自覚症状が改善しない場合は眼科医の診察を受けてください。



●運転中にレンズがずれたり、はずれたりした場合は、運転を中止してください。



●自分のレンズを他人に貸したり、他人のレンズを使用したりしないでください。

他人のレンズを装用すると、眼障害につながります。



取扱説明書

終日装用

ハードコンタクトレンズ

●メニコンZ

●メニコンEX

●メニコンティニュー

●メニコンアイスト

●メニフォーカルZ(遠近両用)



コンタクトレンズは眼に直接のせて使用する「高度管理医療機器」です。必ず眼科医の指示を受けてお求めください。コンタクトレンズやケア用品の取扱方法を誤ると、角膜潰瘍などの重い眼障害につながることがあります。コンタクトレンズとケア用品を安全に取り扱うために、必ず添付文書と取扱説明書をよく読んでからご使用ください。取扱方法や製品に関するお問い合わせは、メニコンお客様センターまでご連絡ください。(詳しくは裏表紙)

⚠ 使用上のご注意

●レンズはていねいに取り扱ってください。



キズがついたり、破損したりすることがあります。
なお、レンズにキズがつくと、
装用中に破損する場合があります。

●レンズに化粧品・ハンドクリーム・ ヘアスプレー・薬品・油類などは絶対につけないでください。



レンズが変質して、使用できなくなります。
また、目に悪い影響を与え、
装用を中止しなければならないことがあります。

●ティッシュペーパーなどの紙類や メガネふきなどの布類、 また爪などでレンズをこすらないでください。



レンズにキズや汚れがついたり、
破損したりすることがあります。

●強くこすり洗いをしたときなどに レンズが裏返る(反転)ことがあります。 装用前には確認してください。



反転したレンズを装用すると、
眼障害につながる恐れがあります。
絶対に装用しないでください。

●レンズのつけはずしが正しく できない場合は、眼科医に相談してください。



すれたり、はずれたりすることがあります。

●レンズ装用中は、眼を手でこすらないでください。



●洗髪、洗顔時にシャンプーや石鹼などが眼に入らないようにしてください。



視界がくもったり、ぼやけたり、
目に刺激を感じたりすることがあります。
また、これらの成分により
レンズが使用できなくなることがあります。

●レンズのケアは、O2ケアシリーズ(O2ケアアミノソラ、抗菌O2ケアミルファ、O2ケア)の使用をお勧めします。



他のケア用品を使用すると、レンズに悪い影響を与え、くもったり見えにくくなったりすることがあります。

●装用中に使用する目薬は防腐剤を含まない人工涙液をおすすめします。



それ以外の目薬は眼科医の指示を受けて使用してください。
目薬の成分がレンズに悪い影響を与えることがあります。

●眼の乾燥を感じたら意識的にまばたきをしてください。



眼が乾燥しやすい状況(風の強い日、冷暖房で空気の乾燥しているところ)では、すれたり、はずれたりすることがあります。

●激しいスポーツをするときは眼に衝撃を受けないようにしてください。 ボールなどが眼や顔に当たると、すれたりはずれたり破損したりすることがあります。



視力や眼に異常を感じた場合は、すぐにレンズの装用を中止し、眼科医に相談してください。

●水泳のときはレンズをはずしてください。



●レンズを熱湯につけたり、高温の場所に置かないでください。



レンズは熱に弱いので、反転したり、変形したりすることがあります。

●床などにレンズを落とした場合は、指先を水でぬらし、レンズを吸い付けるように軽くふれ、引きさげることなく真上に拾い上げてください。



レンズを押さえつけたり引きずったりすると、レンズにキズがついたら破損したりすることがあります。

●レンズは直射日光および凍結を避けて、室温で保管してください。



直射日光や凍結を避けて、室温で保管してください。
指先が思うように動かず、レンズを破損することがあります。

洗浄には十分注意し、すすぎにはぬるま湯(人肌程度の温度)を使用することをおすすめします。

●冬季など低温時の洗浄やすすぎは特にていねいに行ってください。 指先が思うように動かず、レンズを破損することがあります。



すすぎにはぬるま湯(人肌程度の温度)を使用することをおすすめします。

冬季など低温時の洗浄やすすぎは特にていねいに行ってください。
指先が思うように動かず、レンズを破損することがあります。

洗浄には十分注意し、すすぎにはぬるま湯(人肌程度の温度)を使用することをおすすめします。

●旅行のときは滞在期間に合わせて、メガネ・ケア用品などを用意してください。



旅行のときは滞在期間に合わせて、メガネ・ケア用品などを用意してください。

メニフォーカルZ(遠近両用)をご使用の方に特にご注意いただきたいこと

●車の運転は遠近両用レンズの見え方に十分慣れてから行ってください。

天候や環境により、見えにくいことがあります。
特にトンネルなど急激に明るさが変化する場合は、運転に支障をきたし、事故につながるような視力低下を起こす恐れがあります。
見え方に慣れるまでは、メガネまたは通常のコンタクトレンズをご使用ください。



●近くを見るときは、頭をさげずに下目使いをすると、見やすくなります。



●暗いと手元が見えにくいため、新聞・雑誌などを読む際は、手元を明るくするのが効果的です。



●単焦点の近用メガネに比べて見え方の鮮明さが劣ることがあります。



レンズを取り扱う前に

- 眼やレンズをキズつけないために、爪は短く切り、丸くなめらかに整えてください。
- レンズに水ぶる前には、手を石けんでよく洗い、水道水でよくすいでください。
- レンズの左・右眼用を間違えないように、レンズのつけはずしはいつも同じ眼から行ってください。
- レンズを取り扱うときは、化粧品等がレンズにつかないようにしてください。
- 化粧をするときはレンズをつけてから、レンズをはずすときは眼のまわりの化粧品がレンズにつかないようにしてください。
- レンズの紛失やキズ・汚れを防ぐためにも、レンズのつけ・はずしは落としても見つけやすく、汚れにくい清潔な場所で行ってください。


レンズのチェック

レンズの異常を確認

- レンズをつける前に汚れがついていないか、またキズや破損などがないか、よく確認してください。レンズに異常がある場合は装用せず、メニコンお客様センターにご連絡ください。
- 装用の際に、レンズにほこりなどがついた場合は、水道水(流水)ですいでください。
- レンズをすぐときには、レンズをホルダーに収納し、ホルダーごと水道水(流水)ですいでください。

レンズがずれたときのアドバイス

- レンズがずれた場合は、あわてずレンズがどこにあるかを確かめてください。レンズが眼の裏側に入ってしまうことは絶対にありませんので、落ち置いて探してください。
- 指先で直接レンズにふれて戻さないでください。眼をキズつける恐れがあります。



終日装用の装用スケジュール

レンズの装用に慣れるまでのスケジュールは個人差があります。
必ず眼科医の指示に従って、あなたに最も合ったスケジュールで慣らしてください。
連続装用をご希望される方は、スケジュールが異なりますので、眼科医に相談してください。



装用スケジュール例

装用日数	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目から
装用時間	8時間	10時間	12時間	14時間	16時間	終日装用

装用を中断後、再開する場合

- 【1か月未満の中断】 中断する前と同じ装用時間で装用ができます。
- 【1か月以上の中断】 眼科医の検査を受けてから指示に従って装用を開始してください。

終日装用の定期検査

定期検査は、眼障害の早期発見やレンズについてのキズや汚れの状態の確認をするための大切な検査です。

下記のスケジュール①または②に従って必ず検査を受けてください。


定期検査受診スケジュール①



以降3ヶ月毎に必ず検査を受けてください。


定期検査受診スケジュール②

眼科医の指示に従って必ず検査を受けてください。



レンズのつけ方

- ① 利き手の人さし指の先にレンズをのせます。



- ② 鏡を見ながら利き手の中指で下まぶたを引き下げ、もう一方の手の人さし指で上まぶたをあげます。



まつ毛のはえぎに指をあてます。

- ③ レンズをゆっくりと黒眼にのせます。



眼を細めたり、まばたきをしたりするとうまく黒眼にのりません。

レンズをのせるときは眼に強く押しつけたり、爪を立てたりしないでください。

- ④ ゆっくりまばたきします。

●黒眼とレンズの間に空気が入った場合は、ゆっくりとまばたきをすると抜けます。



あわててまばたきをすると、レンズがずれたり、はずれたりすることがあります。

- ⑤ 左右の見え方を確認してください。

レンズの左右を間違えると、見え方や装用感を感じることがあります。違和感を感じたら、O2ケアシリーズでレンズを洗浄し、水道水(流水)ですいでからつけなおしてください。




レンズのはずし方

- ① 鏡を見ながら眼を大きくあけて、レンズの位置を確かめます。



- 指先の水分をふきとってください。●レンズをはずすときには、まぶたやまつ毛の化粧品がレンズにつかないように注意してください。

- ② はずす眼と同じ側の手の人さし指で目じりを押さえ、レンズより大きく眼をひらいたまま、耳側やや上方へひっぱってから、ゆっくりとまばたきをすればOKです。



眼が細くなっているとまばたきのタイミングが早すぎるとはずれません。

爪や指先が直接眼にふれないようにしてください。

- ③ もう一方の手のひらで、はずれて落ちるレンズを受け止めてください。




- ④ 本レンズは、はずしたらO2ケアシリーズでレンズケアを行ってください。



*別途レンズケースが必要です。

レンズがはずれたときのアドバイス

- レンズがずれた場合は、あわてずレンズがどこにあるかを確かめてください。レンズが眼の裏側に入ってしまうことは絶対にありませんので、落ち置いて探してください。
- 指先で直接レンズにふれて戻さないでください。眼をキズつける恐れがあります。



レンズがはずれにくい場合

目じりの下がっている方

上まぶたを少しあげ気味にして、真横か耳側上方へひっぱります。



目じりの上がっている方

指を立て、できるだけ黒眼に近いところから目じりをひっぱります。




レンズがはずれにくい場合やはりついた場合などに…

SPスポットもご使用いただけます。

※ご使用前に、SPスポットの使用説明書を必ずお読みください。

レンズホルダーからの取り出し方

- 人さし指と親指の腹で、ホルダーをはさむようにして軽く押さえ、レンズを取り出してください。●ホルダーを無理に広げると戻らなくなります。



レンズがずれたときのなおし方

- レンズを上から押さないでください。白眼にレンズがはりつくことがあります。●指先の水分をふきとめてください。

レンズが耳側にずれたとき

- ① 鏡を鼻側に持ち、眼だけ鏡の方を見てください。



- ② 人さし指と中指で目じりを押さえ、レンズを固定させます。



- ③ 鏡をゆっくり正面まで動かし、同時に黒眼をレンズのところまで動かします。



レンズが鼻側にずれたとき

- ① 鏡を耳側に持ち、眼だけ鏡の方を見てください。



- ② 人さし指で目がしらを押させて、レンズを固定させます。



- ③ 鏡をゆっくり正面まで動かし、同時に黒眼をレンズのところまで動かします。



レンズが上方にずれたとき



- ① 鏡を下方に持ち、眼だけ鏡の方を見てください。



- ② 人さし指で上まぶたを押させて、レンズを固定させます。



レンズが下方にずれたとき



- ① 鏡を上方に持ち、眼だけ鏡の方を見てください。



- ② 人さし指で下まぶたを押させて、レンズを固定させます。



O2ケアアミノソフと抗菌O2ケアミルファのレンズケア

① 保存液の準備

レンズケースに本液を約9分目まで入れます。



② 保存

- ① レンズをはずしてホルダーに収納します。
- ② レンズケースのキャップをしめます。
- ③ 一晩(4時間以上)保存します。



③ すすぎ・洗浄・すすぎ

- ① レンズをレンズホルダーごと、水道水(流水)で5~10秒すすぎます。
- ② レンズに本液をつけ、十分にこすり洗いします。
- ③ 再度レンズをホルダーに収納し、水道水(流水)で5~10秒すすぎます。



④ レンズをつける



⑤ レンズケースの洗浄

レンズケースを水道水ですすぎ洗いし、清潔な場所で自然乾燥させます。



O2ケア+プロテオフのレンズケア

① 保存液の準備

- ① レンズケースにO2ケアを約9分目まで入れます。
- ② プロテオフをレンズ1枚につき1滴加えます。
- プロテオフの滴下口がO2ケアに触れないよう、プロテオフを滴下してください。



② 保存

- ① レンズをはずしてホルダーに収納します。
- ② レンズケースのキャップをしめます。
- ③ 軽く振り、一晩(2時間以上)保存します。



③ すすぎ・洗浄・すすぎ

- ① レンズをレンズホルダーごと、水道水(流水)で5~10秒すすぎます。
- ② レンズにO2ケアをつけ、十分にこすり洗いします。
- ③ 再度レンズをホルダーに収納し、水道水(流水)で5~10秒すすぎます。



④ レンズをつける



⑤ レンズケースの洗浄

レンズケースを水道水ですすぎ洗いし、清潔な場所で自然乾燥させます。

